

	CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA		NOTA FINAL	
	Aluno:			
	Componente Curricular: PEDIATRIA, MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL e OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA			
	Professor (es):			
	Período: 202102	Turma:	Data:	

2022 Processo Seletivo Residência Médica

GABARITO DE PROVA (RESUMIDO) PROVA 04803 - CADERNO 002

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
001	(D)	016	(D)	031	(D)	046	(E)
002	(E)	017	(E)	032	(E)	047	(C)
003	(C)	018	(C)	033	(C)	048	(B)
004	(A)	019	(B)	034	(C)	049	(E)
005	(E)	020	(A)	035	(B)	050	(B)
006	(D)	021	(B)	036	(D)	051	(C)
007	(C)	022	(C)	037	(C)	052	(E)
008	(E)	023	(C)	038	(C)	053	(E)
009	(E)	024	(D)	039	(E)	054	(A)
010	(B)	025	(C)	040	(B)	055	(A)
011	(E)	026	(E)	041	(C)	056	(B)
012	(B)	027	(D)	042	(B)	057	(A)
013	(D)	028	(B)	043	(B)	058	(A)
014	(C)	029	(D)	044	(A)	059	(C)
015	(C)	030	(A)	045	(A)	060	(D)

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
061	(A)	076	(B)	091	(E)
062	(E)	077	(D)	092	(A)
063	(B)	078	(C)	093	(E)
064	(D)	079	(A)	094	(C)
065	(A)	080	(D)	095	(E)
066	(A)	081	(D)	096	(B)
067	(B)	082	(E)	097	(C)
068	(C)	083	(C)	098	(C)
069	(D)	084	(D)	099	(C)
070	(D)	085	(A)	100	(D)
071	(A)	086	(C)		
072	(C)	087	(A)		
073	(D)	088	(D)		
074	(C)	089	(A)		
075	(B)	090	(A)		

	UNIFIP CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS RESIDÊNCIA MÉDICA			NOTA FINAL
	Aluno:			
	Componente Curricular: PEDIATRIA, MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA			
	Professor (es):			
202102	Período:	Turma: -	Data:	

**2022 Processo Seletivo Residência Médica
- CADERNO DE QUESTÕES 002 -**

1ª Questão

O exame laboratorial mais importante no Abdome Agudo Inflamatório é o hemograma, sendo um importante recurso propedêutico no fechamento do diagnóstico de abdome agudo inflamatório. Qual das assertivas abaixo, é o achado mais comum no hemograma do paciente com este tipo de patologia?

- a. Pancitopenia
- b. Leucocitose com linfopenia
- c. Leucopenia com plaquetose
- d. Leucocitose com desvio a esquerda
- e. Leucocitose com desvio a direita

2ª Questão

A cicatriz umbilical corresponde ao dermatomo:

- a. T8
- b. T12
- c. T9
- d. T11
- e. T10

3ª Questão

Paciente D. J. E. M, 28 anos, apresentou quadro de diarreia crônica com muco e sangue, tendo realizado colonoscopia e consulta com gastroenterologista, sendo diagnosticado recentemente com Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI) após propedêutica adequada. Sobre esta patologia, qual dos achados abaixo é o mais concordante com esse diagnóstico?

- a. Acometimento inflamatório colônico em pedra de calçamento (cobblestones)
- b. Acometimento perianal
- c. Acometimento inflamatório contínuo da mucosa
- d. Acometimento transmural com formação de fístulas e estenoses
- e. Úlceras aftóides

4ª Questão

Segundo o artigo 6 da Lei 8080, são campos de atuação do Sistema Único de Saúde, todas as assertivas abaixo, **exceto**?

- a. Participação popular
- b. Saúde do Trabalhador
- c. Vigilância Sanitária
- d. Vigilância Epidemiológica
- e. Assistência a saúde

5ª Questão

Crianças que apresentam sibilância podem ter uma ampla gama de causas desta condição clínica. Dentre as causas abaixo, qual raramente causa a sibilância?

- a. Fibrose cística
- b. Asma
- c. Refluxo gastroesofágico
- d. Tuberculose
- e. Alergia ao leite de vaca

6ª Questão

Assim como o HPV (Papiloma Vírus Humano) tem íntima relação com a patogenia do câncer de colo uterino, o mesmo também está bem documentado na correlação com os cânceres de:

- a. Próstata
- b. Rins
- c. Bexiga
- d. Pênis
- e. Testículo

7ª Questão

A abordagem do adolescente é uma prerrogativa da Medicina da Família que deve ser feita na perspectiva da integralidade. Em uma consulta com um adolescente, qual das assertivas abaixo é um indicativo de resiliência no meio social em que ele está inserido?

- a. Impulsividade.
- b. Isoalmento social.
- c. Valores sociais preservados.
- d. Escola muito grande.
- e. Estilo permissivo.

8ª Questão

Sabemos que a sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica, de etiologia desconhecida, que acomete virtualmente todos os sistemas orgânicos, sendo o acometimento pulmonar mais comum, em cerca de 90% dos casos. Sobre esta patologia, podemos afirmar que:

- a. O pico de incidência ocorre após a 5ª década de vida.
- b. A maioria dos pacientes cursa com hepatomegalia.
- c. A síndrome de Lofgren é caracterizada por quadro agudo de febre, eritema nodoso e poliartrite associada a linfonodomegalia hilar bilateral e tem péssimo prognóstico.
- d. A incidência é maior em homens do que em mulheres, na proporção 1:3.
- e. Quando da ocorrência de acometimento ocular, a uveíte anterior é achado mais comum.

9ª Questão

A correta avaliação do desenvolvimento puberal é uma etapa importante da avaliação do desenvolvimento da criança e adolescente na Atenção Primária. Ao examinar o desenvolvimento puberal durante uma consulta, o médico observa que os pelos pubianos se estendem sobre a sínfese púbica e são mais escuros, grossos e encaracolados. Em que estágio de desenvolvimento puberal se encontra este menor?

- a. Estágio 1
- b. Estágio 5
- c. Estágio 2
- d. Estágio 4
- e. Estágio 3

10ª Questão

As situações relacionadas a hipertensão arterial, estão entre as principais causas de desfecho negativos em relação a mortalidade materna. Podemos considerar situações que caracterizam a pré-eclâmpsia grave, as seguintes situações ?

- a. Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito.
- b. Todas estão corretas.
- c. Plaquetopenia menor que 100 000 mm.
- d. Creatinina maior que 1.2 mg/dl.
- e. 2 cruzeiros na fita urinária de proteinúria.

11ª Questão

O abdome agudo causado por apendicite aguda é apontada como uma das condições mais frequentes na clínica cirúrgica. Dentre as assertivas abaixo, qual é o diagnóstico diferencial de apendicite aguda?

- a. Litiase renal
- b. Pielonefrite
- c. Colecistite
- d. Adenite mesentérica
- e. Todas estão corretas

12ª Questão

Ao suspeitar de um abdome agudo por doença inflamatória pélvica, suspeita-se que entre as assertivas abaixo o agente etiológico mais comum seria ?

- a. Candida Albicans
- b. Chlamydia Trachomatis
- c. Treponema Pallidum
- d. Estafilococos Aureus
- e. Gardnerella Vaginalis

13ª Questão

Em pacientes com hipotireoidismo, são esperados todos os sintomas abaixo, exceto:

- a. Coloração amarelada da pele
- b. Palidez cutânea
- c. Queda de cabelo
- d. Pele úmida
- e. Hiperqueratose

14ª Questão

A Lei 8080 explicita os determinantes e condicionantes de saúde no seu artigo terceiro. Qual das assertivas abaixo é considerada determinante ou condicionante de saúde?

- a. Lazer
- b. Transporte
- c. Todas estão corretas
- d. Educação
- e. Moradia

15ª Questão

A diferenciação de convulsões febris simples e complexas exige uma atenta observação clínica e muito boa capacidade de comunicação com a família. Dentre as assertivas abaixo é característica de síndrome convulsiva febril complexa ?

- a. Crises generalizadas
- b. Duração de 10 minutos
- c. Manifestações focais
- d. Ausência de problemas neurológicos complexos
- e. Uma crise no período de 24 horas

16ª Questão

Paciente L.O.P.T, masculino, 48 anos, sem antecedentes patológicos progressivos, deu entrada no Hospital Regional de Patos com quadro de dor abdominal em epigástrio, com irradiação para a região de dorso, associado a febre, vômitos e mal estar geral. A dor apenas melhorou após administração de opióide e demais sintomáticos. O médico do plantão solicitou US de adome total que evidenciou quadro de colecistopatia litiásica sem sinais de colecistite associada. Prosseguiu investigação com exames laboratoriais que evidenciaram: Hb: 13,5 Leuc: 11.500 (neutrófilos: 44%, linfócitos: 32%), plaquetas 220.000, amilase: 240 U/L (normal até 150 U/L), Lipase: 100 U/L (normal até 60). Realizou TC de abdome que evidenciou: "Alterações pancreáticas associadas a inflamação peripancreática, sem evidência de necrose". De acordo com a classificação de Balthazar, o paciente melhor seria classificado como:

- a. Balthazar E
- b. Balthazar A
- c. Balthazar D
- d. Balthazar C
- e. Balthazar B

17ª Questão

A realização de todas as etapas da consulta do pré-natal, consolida a relação entre a gestante e seu terapeuta. Neste aspecto, a escuta dos batimentos cardíofetais com USG dopler deve ser iniciada em torno de que idade gestacional ?

- a. De 5 a 6 semanas gestacionais.
- b. De 8 a 10 semanas de idade gestacional.
- c. A partir de 16 semanas de idade gestacional.
- d. De 6 a 8 semanas gestacionais.
- e. De 10 a 12 semanas de idade gestacional.

18ª Questão

Ao se deparar durante o pré-natal com uma gestante com fator RH negativo e o parceiro com fator RH Positivo, indica-se para o correto seguimento deste caso, como medida inicial ?

- a. O encaminhamento para o pré-natal de alto risco independente dos exames.
- b. A solicitação de Coombs direto para a gestante durante o pré-natal.
- c. A solicitação de Coombs indireto para a gestante durante o pré-natal.
- d. Não solicitar exames para a gestante, explicando que o quadro não gera riscos.
- e. A solicitação de eletroforese de hemoglobina.

19ª Questão

A pega adequada para a amamentação deve ser orientada para que este ato seja efetivo e resulte nos benefícios continuados para a mãe e o lactente . Qual das assertivas abaixo não é indicativa de boa pega ?

- a. Boca bem aberta
- b. Ruídos na língua
- c. Mais aréola visível acima da boca do bebê
- d. Queixo tocando a mama
- e. Lábio inferior voltado para fora

20ª Questão

A diabetes gestacional tem aumentado sua incidência e representa um substancial aumento de risco para um desfecho favorável da gestação. Podemos afirmar que dentre as assertivas abaixo, constituem risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional, todas as opções, exceto?

- a. IMC maior que 20 da gestante no início da gestação.
- b. Gestante com hipertensão arterial.
- c. História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau.
- d. Idade materna avançada.
- e. Síndrome dos ovários policísticos.

21ª Questão

Paciente de 20 anos teve diagnóstico de meningite, sendo internado para tratamento adequado. Aflitos, os familiares lhe procuram para esclarecimento acerca de quimioprofilaxia dos contactantes. Você os tranquiliza e explica que o paciente em questão não teve meningite por agentes que indiquem a quimioprofilaxia, que são:

- a. Pseudomonas e pneumococo
- b. *Haemophilus* e Meningococo
- c. *Haemophilus* e MRSA
- d. Tuberculose e Meningococo
- e. Meningococo e MRSA

22ª Questão

Ao examinar uma paciente com corrimento vaginal, sua médica de família descarta sinais de cervicite e observa um corrimento grumoso, eritema vulvar, com ph abaixo de 4.5 e teste de K OH) negativo. Dentre as opções abaixo, sabendo que a paciente não está grávida, a melhor assertiva para o tratamento seria?

- a. Metronidazol gel vaginal.
- b. Azitromocina 1 grama dose única.
- c. Miconazol creme vaginal.
- d. Metronidazol 2 g dose única.
- e. Tinidazol, 2g dose única.

23ª Questão

Ao realizar o exame físico de um paciente que apresenta dor abdominal aguda e equimose periumbilical, temos mais provavelmente que sinal?

- a. Sinal de Gray Turner
- b. Sinal de Babinski
- c. Sinal de Cullen
- d. Sinal de Jobert
- e. Sinal de Grey-Turner

24ª Questão

O artigo fundamental da Constituição Federal de 1988, que conceitua o princípio da Universalidade ao determinar que "Saúde é direito de todos e dever do estado" é o artigo?

- a. 198
- b. 197
- c. 200
- d. 196
- e. 199

25ª Questão

O choro do recém-nascido muitas vezes é causa de desespero de famílias e intensa preocupação do médico de família. A interpretação dos tipos de choro tem um caráter subjetivo, mas pode ser um importante momento educativo para a família quando bem orientado pelo profissional de saúde. Ao receber o relato que o choro do bebê apresenta-se como um lamento curto, agudo e muito alto, seguido de um período de apneia e depois de outro grito. Provavelmente temos um choro por?

- a. Fome
- b. Desconforto
- c. Dor
- d. Fadiga
- e. Descompressão

26ª Questão

As cefaléias são condições clínicas que muito preocupam os familiares de crianças com esta condição clínica . Podemos afirmar sobre a migrânea nas crianças. .

- a. Os triptanos não se mostram eficazes no tratamento agudo da migrânea em crianças.
- b. A acupuntura não deve ser utilizada em crianças com migrânea como elemento terapêutico.
- c. A diferenciação diagnóstica de cefaléia tensional e migranosa na criança é simples de ser realizada.
- d. Não é possível realizar o tratamento farmacológico profilático de migrânea em crianças.
- e. Medidas de relaxamento demonstram boa resposta no tratamento da migrânea em crianças.

27ª Questão

São critérios maiores de Jones, segundo a classificação modificada de 1992, exceto:

- a. Coréia de Sydenham
- b. Artrite
- c. Cardite
- d. Febre
- e. Eritema marginado

28ª Questão

Paciente A. M. B, 62 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de HAS e DM2 há cerca de 10 anos, deu entrada na UPA Campo da Liga com quadro de dispnéia aos mínimos esforços que iniciou há 7 dias e com piora nas últimas 24h. Faz uso regular de Losartana 50mg 2x dia, metformina 500mg 2x dia e sinvastatina 40mg/dia. Ao exame na urgência apresenta-se com frequência respiratória de 28 irpm, frequência cardíaca de 118bpm, Spo2 95%, PAS 140mmHg e PAD 90mmHg, creptos bibasais e ausculta cardíaca com B3 e edema de MMII 2+/4+, bom nível de consciência e TEC < 3 segundos. De acordo com o quadro clínico acima é possível afirmar que:

- a. A paciente acima está em quadro de iminência de choque cardiogênico, sobretudo pela presença de B3 na ausculta cardíaca.
- b. A paciente acima é congesta sem baixo débito
- c. A paciente acima não é congesta e não tem baixo débito
- d. A paciente acima não apresenta sinais de baixo débito ou congestão
- e. A paciente acima é congesta e com baixo débito

29ª Questão

Entre as complicações possíveis do aleitamento materno temos a mastite e o abscesso mamário . Dentre as medidas para prevenção destes agravos , não é uma assertiva válida ?

- a. Esvaziamento completo da mama durante a amamentação
- b. Aleitamento sobre livre demanda
- c. Boa pega
- d. Uso de cefalexina profilaticamente em baixas doses
- e. Ordenha das mamas nos casos de produção de leite maior que a demanda do lactente

30ª Questão

Paciente do sexo feminino, 43 anos, diagnosticada com Artrite Reumatoide, evolui com quadro de esplenomegalia e neutropenia sustentadas. De acordo com este quadro clínico, é mais provável que a paciente tenha o diagnóstico de:

- a. Síndrome de Felty
- b. Síndrome de Fahr
- c. Síndrome de Haff
- d. Doença de Machado- Joseph
- e. Doença de Sharp

31ª Questão

O uso de medicações usadas durante o período da amamentação exige cautela e conhecimento do médico de família . Qual das drogas abaixo deve ser evitada ou usada com cuidado durante a amamentação ?

- a. Beclometasona
- b. Amoxicilina
- c. Predisona
- d. Sertralina
- e. Levotiroxina

32ª Questão

A dor abdominal recorrente é uma condição frequente e benigna no atendimento de crianças . Contudo , como praticamente em todas as situações clínicas, podem surgir sinais de alerta nesta condição . Laboratorialmente, qual das assertivas abaixo se caracteriza como sinal de alerta ?

- a. Elevação do PCR.
- b. Elevação do VHS.
- c. Alterações no hemograma.
- d. Urocultura positiva .
- e. Todas estão corretas.

33ª Questão

A violência contra a criança e o adolescente é um tragédia que desafia os serviços de atenção primária diariamente . Diante deste quadro, quais as assertivas abaixo são indicativos da Síndrome do bebê sacudido no lactente?

- a. Hemorragias subaracnóide.
- b. Fraturas metafisárias.
- c. Todas estão corretas.
- d. Hemorragias retinianas.
- e. Hematomas subdurais.

34ª Questão

O aleitamento materno, sobretudo o exclusivo , beneficia a criança e a mãe que amamenta em vários aspectos . Qual das assertivas abaixo é um benefício esperado da amamentação para o bebê ?

- a. Diminuição da morte súbita dos lactentes
- b. Diminuição da morbidade , especificamente relacionada as infecções
- c. todas estão corretas
- d. Redução do risco de obesidade
- e. Redução do risco de hemorragia pós parto

35ª Questão

São critérios menores de Duke modificados, exceto:

- a. Fenômenos vasculares
- b. Sopro regurgitante
- c. Nódulos de Osler
- d. Manchas de Roth
- e. Febre > 38º C

36ª Questão

Levando em consideração a prática clínica, estão listados exemplos de abdome agudo obstrutivo, exceto na alternativa:

- a. ileo biliar
- b. volvo
- c. Bridas
- d. Infarto esplênico
- e. Hernia

37ª Questão

Várias patologias são capazes de gerar os chamados abdome agudo vascular. Invariavelmente, causando situações de risco de morte para o paciente. Qual das condições clínicas citadas abaixo não caracteriza um abdome agudo vascular?

- a. Torção do mioma uterino
- b. Trombose dos vasos mesentéricos
- c. Hérnias
- d. Torção do pedículo do cisto ovariano
- e. Infarto esplênico

38ª Questão

Sobre a síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), marque a alternativa **incorreta**:

- a. No WPW oculto, não há alteração eletrocardiográfica, sendo o diagnóstico realizado através do estudo eletrofisiológico demonstrando taquiarritmia por reentrada atrioventricular (via acessória).
- b. São sintomas clínicos que podem ocorrer na presença de síndrome de WPW: presença de pré-síncope, síncope e palpitações.
- c. O eletrocardiograma característico da síndrome de WPW consta de intervalo PR alargado, presença de onda delta, QRS alargado e alteração de repolarização ventricular.
- d. As alterações do eletrocardiograma podem ser intermitentes
- e. Não há síndrome de WPW sem associação de manifestações clínicas com a presença de alterações eletrocardiográficas específicas, sendo então chamado de pré-excitação ventricular.

39ª Questão

Durante uma investigação ginecológica de uma paciente no consultório em APS, o profissional médico faz diagnóstico de uma cervicite por gonorréia. Qual das assertivas abaixo é o tratamento inicial mais adequado ?

- a. Metronidazol ou secnidazol.
- b. Azitromicina ou doxiciclina.
- c. Penicilina Benzntina em três doses.
- d. Fluconazol ou itaconazol.
- e. Ciprofloxacino ou ceftriaxona.

40ª Questão

Ao atender uma criança com uma inflamação que recobre a parte interna da pálpebra e a esclera do olho , com quadro de ardor, prurido, hiperemia e secreção mucopurulenta ocular, temos ,mais provavelmente, como diagnóstico?

- a. Conjuntivite viral.
- b. Conjutivite bacteriana.
- c. Conjuntivite alérgica.
- d. Rinosinusite.
- e. Rinite vasomotora.

41ª Questão

A prescrição de drogas para as variadas condições clínicas é motivo de preocupação durante o pré-natal. . Das medicações abaixo, qual representa nítida possibilidade de causar mais malefício do que benefício, com estudo em humanos demonstrando este risco?

- a. Levotirixina.
- b. Metildopa.
- c. Captopril.
- d. Amoxicilina.
- e. Cefalexina.

42ª Questão

O tratamento dos corrimentos genitais deve ser baseado em evidências, inclusive no que se refere ao tratamento das parcerias sexuais assintomáticas. Nesta perspectiva, em que deve se tratar a parceira mesmo quando assintomática ?

- a. Clamídia e candidíase.
- b. Clamídia e tricomoníase.
- c. Candidíase e tricomoníase.
- d. Vaginose e clamídia.
- e. Vaginose e candidíase.

43ª Questão

Ao realizar percussão do hipocôndrio direito com detecção de timpanismo. É indicativo de pneumoperitônio (ar na cavidade abdominal). Esta manobra é determinada?

- a. Sinal de Giordano
- b. Sinal de Jobert
- c. Sinal de Corvoisier - Terrier
- d. Sinal de Cullen
- e. Sinal de Gray - Turner

44ª Questão

A introdução de alimentação na criança que recebe o aleitamento materno exclusivo ou predominante, geralmente é uma fase de preocupação para as famílias . Em crianças que continuam com aleitamento materno predominante , quando deve ser introduzido a segunda papa salgada na dieta ?

- a. Aos 7 meses
- b. Aos 6 meses
- c. Aos 8 meses
- d. Aos 5 meses
- e. Aos 4 meses

45ª Questão

A rotina do pré-natal deve seguir as orientações baseadas em evidências. São exames que devem ser pedidos, obrigatoriamente, de rotina no pré-natal no primeiro trimestre, todas as assertivas, exceto ?

- a. TSH /T livre.
- b. Sorologia para Toxoplasmose.
- c. Fator ABO RH.
- d. Hemograma completo.
- e. Teste rápido para HIV.

46ª Questão

Ao atender um paciente que pilota motocicleta, o médico de família indaga se o mesmo usa capacete. Que prevenção este profissional está realizando?

- a. Prevenção Secundária
- b. Conselho terapêutico
- c. Prevenção quaternária
- d. Prevenção Terciária
- e. Prevenção Primária

47ª Questão

O Princípio do SUS que possibilita que o usuário do SUS acesse todos os níveis de atenção à saúde de acordo com a sua necessidade é encontrado no conceito de?

- a. Equidade
- b. Competência Cultural
- c. Integralidade
- d. Participação popular
- e. Universalidade

48ª Questão

O Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), é a base filosófica de uma prática médica humanizada e integradora. Nesta perspectiva o componente subjetivo da Nota SOAP do MCCP, inclui as seguintes dimensões abaixo, **exceto**?

- a. Ideias
- b. Medicações
- c. Sentimentos
- d. Funções
- e. Expectativas

49ª Questão

Ao indicar a um paciente de 45 anos e com sobrepeso para fazer um exame de glicemia de jejum, temos uma ação de?

- a. Prevenção quaternária
- b. Prevenção Terciária
- c. Prevenção Primária
- d. Conselho terapêutico
- e. Prevenção Secundária

50ª Questão

Ao atender uma pessoa, o profissional médico encontra presença de icterícia, vesícula biliar distendida e ausência de dor. Ao continuar a investigação o diagnóstico é fechado como câncer pancreático. Como se chama o sinal relatado?

- a. Sinal de Murphy
- b. Sinal de Couvosier
- c. Sinal de Jobert
- d. Sinal do Giordano
- e. Sinal de Charcot

51ª Questão

Paciente do sexo feminino, 39 anos, com quadro de poliúria e “fraqueza nas pernas” nas últimas semanas, relata ser hipertensa em uso de betabloqueador e de outra medicação “calmante” a qual não sabe relatar o nome. De acordo com o quadro clínico é mais provável que a paciente faça uso de:

- a. Clorpromazina
- b. Acido Valpróico
- c. Lítio
- d. Amitriptilina
- e. Clonazepam

52ª Questão

A classificação de uma gestação pós-termo é muito importante por todos os riscos inerentes a esta situação para a gestante e para o feto. Considera-se uma gestação pós-termo ?

- a. A partir de 39 semanas.
- b. A partir de 40 semanas.
- c. A partir de 37 semanas.
- d. A partir de 41 semanas.
- e. A partir de 42 semanas.

53ª Questão

A Ultrassonografia transvaginal é o exame de imagem inicialmente solicitado, possibilitando avaliar a presença de abscesso tubo-ovariano. A laparoscopia é o padrão ouro, mas é impraticável como procedimento de rotina, ficando restrito aos casos em que a dúvida persiste após investigação com outros métodos de imagem. Este caso indica mais provavelmente um abdome agudo inflamatório...?

- a. Pancreatite
- b. Colescistite
- c. Apendicite
- d. Diverticulite
- e. Doença inflamatória Pélvica

54ª Questão

Aplicar e reconhecer os Atributos da Atenção Primária (APS) à Saúde como ferramentas de organização dos serviços amplia a qualidade dos serviços, aumentando sua eficiência e eficácia. Quando atendemos uma pessoa com crise asmática na Unidade de Saúde sem que ele precise ter marcado a consulta, qual dos Atributos da APS prevalece?

- a. Acesso
- b. Competência cultural
- c. Abordagem familiar
- d. Abordagem comunitária
- e. Longitudinalidade

55ª Questão

1. Três diferentes pacientes realizaram eletroforese de hemoglobinas, abaixo listadas. De acordo com a análise destes exames é possível afirmar que:

Doença	HbA	HbS	HbA2	HbF	HbC
Paciente A	0%	85-95%	2-3%	5-15%	0%
Paciente B	55-60%	40-45%	2-3%	1%	0%
Paciente C	0%	45-50%	2-3%	1%	45-50%

Assinale a alternativa correta:

- a. O paciente B é portador de hemoglobinopatia SC
- b. Não há correspondência correta entre os diagnósticos e as alternativas acima.
- c. Tanto o paciente B quanto o paciente C tem diagnóstico de talassemia, alfa e beta, respectivamente
- d. O paciente B é portador de anemia falciforme
- e. O paciente A é portador de traço falcêmico

56ª Questão

A detecção do câncer de colo uterino é baseado no rastreamento que segue evidências científicas. Dentre as assertivas abaixo, qual das opções não é fator de risco para câncer de colo uterino?

- a. Tabagismo intensivo.
- b. Uso de álcool.
- c. Imunossupressão.
- d. áreas condições socioeconômicas.
- e. Infecção pelo HPV.

57ª Questão

A doença inflamatória pélvica exige da equipe médica que atende esta condição, além de competência clínica, a expertise no diagnóstico diferencial. Dentro desta condição, recomenda-se a solicitação de quais dos exames abaixo?

- a. Todas estão corretas
- b. VHS
- c. Hemograma completo
- d. Teste da gravidez
- e. Urina 1 e cultura

58ª Questão

Entre os cuidados que devem ser oferecidos a mulher no puerpério, estão as orientações de risco para trombose venosa profunda. Dentre as assertivas abaixo, qual opção podemos destacar como sinal de alerta para esta condição clínica?

- a. Todas estão corretas.
- b. Dispnéia ou precordialgia.
- c. Edema na panturrilha.
- d. Dor unilateral na panturrilha.
- e. Hiperemia na panturrilha.

59ª Questão

Os atributos da Atenção Primária são divididos em essências e derivados. Dentre as assertivas abaixo o que não é classificado como um atributo essencial?

- a. Acesso
- b. Coordenação do cuidado
- c. Competência cultural
- d. Longitudinalidade
- e. Integralidade

60ª Questão

São pontos fundamentais do Relatório Flexner de 1910, marco regulatório do ensino médico mundial, todas as assertivas abaixo, **exceto**?

- a. Incentivo do ensino em hospitais
- b. Maior controle do ensino médico
- c. Expansão do ensino clínico
- d. Valorização do médico de família
- e. Valorização de experimentação biológica

61ª Questão

Ao orientar um casal que traz um filho de 9 meses de idade a realizar a vacina para febre amarela, o médico de família realizou uma ação de?

- a. Prevenção Primária
- b. Prevenção Quaternária
- c. Conselho terapêutico
- d. Prevenção Terciária
- e. Prevenção Secundária

62ª Questão

A amenorréia pode ser causada por questões fisiológicas, anatômicas, genéticas e ovarianas. Dentre as amenorréias ovarianas, temos como causas possíveis?

- a. Falência ovariana precoce.
- b. Síndrome dos ovários policísticos.
- c. Síndrome dos ovários resistentes.
- d. Tumor ovariano de granulosa.
- e. Todas estão corretas.

63ª Questão

O Princípio do SUS que determina que todas as pessoas residentes no Brasil tem direito ao acesso do sistema de Saúde, dentre as assertivas abaixo é encontrada no conceito de?

- a. Equidade
- b. Universalidade
- c. Participação Popular
- d. Integralidade
- e. Longitudinalidade

64ª Questão

O abdome agudo é uma queixa que muitas vezes aparece em serviços de atenção primária e precisa ser manejada de acordo com as evidências mais adequadas. Uma situação de pancreatite aguda pode ser classificada como um abdome agudo...?

- a. hemorrágico
- b. isquêmico
- c. vascular
- d. inflamatório
- e. obstrutivo

65ª Questão

Ao atender uma gestante em uma consulta de acolhimento, esta se queixa de disúria e poliúria. Não apresenta febre nem calafrio, giordano negativo e nega outras queixas e o restante do exame físico é normal. Qual a conduta inicialmente mais adequada?

- a. Precever antibiótico empírico dos protocolos, solicitando urocultura de controle 7 a 10 dias após o final do tratamento.
- b. Tranquilizar que o quadro é benigno e não é necessário conduta neste momento.
- c. Solicitar Urocultura e medicar de acordo com o resultado.
- d. Encaminhar para o pré-natal de alto risco.
- e. Solicitar Urina 1 e medicar de acordo com o resultado.

66ª Questão

O arcabouço jurídico do SUS garante a participação popular através de ferramentas como os Conselhos e as Conferências de Saúde que é garantida por qual Lei?

- a. Lei 8142
- b. Lei 7508
- c. Lei 8080
- d. NOB 96
- e. Lei dos Mais Médicos

67ª Questão

O médico de família ao receber os exames de primeiro trimestre do pré-natal de uma gestante, verifica que a mesma apresenta sorologia para toxoplasmose IgG positivo e IgM negativo. Qual a conduta mais adequada?

- a. Repetir a sorologia no terceiro trimestre.
- b. Não há necessidade de repetir sorologias para toxoplasmose.
- c. Repetir a sorologia no segundo e terceiro trimestre.
- d. Solicitar o teste de avidéz para IgG.
- e. Prescrever espiramicina imediatamente.

68ª Questão

Paciente masculino, 42 anos, bancário, natural e procedente de Patos-PB, procura atendimento médico no PSF Rita Palmeira com quadro de fraqueza do extensor longo do hálux direito. De acordo com este único achado confirmado pelo exame físico, você sugere se tratar de radiculopatia de nível de:

- a. L4
- b. S1
- c. L5
- d. L2
- e. L3

69ª Questão

A história do financiamento público da saúde e da previdência brasileira se iniciou no começo do século passado. Como se denomina a Lei que criou a chamada Caixa de Aposentadoria e Pensões?

- a. LEI 7508
- b. LEI AFONSO ARINOS
- c. LEI do INPS
- d. LEI ELOI CHAVES
- e. LEI 8142

70ª Questão

Ao decidir realizar um exame de rastreio para detectar câncer de mama, qual deve ser a principal qualidade do exame a ser escolhido?

- a. Ter alta especificidade
- b. Ter alto valor preditivo positivo
- c. Ter alto valor preditivo negativo
- d. Ter alta sensibilidade
- e. Ter baixo custo

71ª Questão

A Inglaterra e o NHS são pilares e referências mundiais para os sistemas públicos de saúde e o desenvolvimento de estruturas da Atenção Primária. Como se chama o marco teórico que esboçou este sistema de saúde?

- a. Relatório Dawson
- b. Relatório Flexner
- c. Congresso de Alma Ata
- d. Welfare State
- e. Relatório de Saúde da OMS

72ª Questão

O aparecimento da sibilância em crianças, em algumas situações podem indicar doença grave. Dentre as assertivas abaixo, qual situação não representa um sinal de alerta ou alerta vermelho para doença mais grave?

- a. Deformidade torácica
- b. Baqueteamento digital
- c. Presença de febre
- d. Estridor
- e. Sinais de desnutrição

73ª Questão

Patologia mais frequente em pacientes idosos. A dor geralmente localiza-se no quadrante inferior esquerdo, no entanto os pacientes podem ter dor no quadrante inferior direito ou suprapúbica devido a presença de um cólon sigmóide redundante. Aproximadamente 50% dos pacientes tiveram um ou mais episódios anteriores de dor semelhante. No exame físico geralmente encontramos uma massa em fossa ilíaca esquerda, palpável em aproximadamente 20% dos pacientes devido a inflamação pericolônica ou abscesso peridiverticular. A hipótese diagnóstica mais provável dentre as assertivas abaixo é?

- a. Pancreatite
- b. Colescistite
- c. Doença inflamatória Pélvica
- d. Diverticulite
- e. Apendicite

74ª Questão

Ao realizar exames complementares em um quadro de abdome agudo, o médico assistente do quadro encontra elevação considerável de amilases e lipase. O diagnóstico mais provável entre as assertivas abaixo seria?

- a. Diverticulite
- b. Torção ovariana
- c. Pancreatite aguda
- d. litíase renal
- e. Colecistite aguda

75ª Questão

A investigação de sangramento vaginal deve ser feita pelo profissional da APS, correlacionando exames complementares a cada hipótese diagnóstica. Qual dos exames não tem utilidade nesta investigação?

- a. USG pélvica.
- b. Todos os exames podem ser úteis.
- c. Hemograma.
- d. Teste de gravidez.
- e. TSH.

76ª Questão

Assinale a alternativa que contém todas as afecções cutâneas pré-malignas nos itens abaixo:

I- Melanose solar

II- Xeroderma pigmentoso

III- Papulose Bowenóide

IV- Ceratose actínica

V- Corno cutâneo

VI- Verruga vulgar

- a. I, II, III, IV, V, VI
- b. II, III, IV, V
- c. III, IV, V
- d. II, V
- e. I, II, III, VI

77ª Questão

Qual principal fator prognóstico relacionado ao Mieloma Múltiplo?

- a. Função renal
- b. Nível de cálcio sérico
- c. Presença de proteína de Bence Jones na urina
- d. Nível sérico de Beta-2-microglobulina
- e. Grau de anemia

78ª Questão

Identificar precocemente os sinais de choque em uma criança que apresenta diarreia e vômito deve ser uma competência de médicos que atuam na atenção primária. Qual dos sintomas ou sinais caracterizam uma criança com choque?

- a. Criança irritada
- b. Secura de mucosas
- c. Criança com pulsos periféricos fracos
- d. Criança com diminuição da diurese
- e. Diminuição do turgor cutâneo

79ª Questão

A semiologia do abdome é etapa fundamental para determinação de patologias cirúrgicas no contexto da Atenção Primária à Saúde. Quais órgãos são encontrados no exame do Hipocôndrio direito dentre as assertivas abaixo?

- a. Fígado, vesícula biliar, rim direito
- b. Baço, estômago, rim esquerdo, cauda do pâncreas
- c. Lobo esquerdo do fígado, piloro, duodeno, cólon transversal e cabeça e corpo do pâncreas
- d. Cólon ascendente, rim direito e jejuno
- e. Duodeno, jejuno, íleo, aorta abdominal, mesentério, linfonodos

80ª Questão

São exemplos de países que utilizam o sistema de financiamento público Beveridgiano, todos os países abaixo, **exceto**?

- a. Inglaterra
- b. Brasil
- c. Espanha
- d. Alemanha
- e. Canadá

81ª Questão

Ao diagnosticar uma gestante no segundo trimestre de gravidez com sífilis latente tardia, a medida mais correta que deve ser tomada pelo médico da atenção primária seria?

- a. Encaminhar ao pré-natal de alto risco.
- b. Prescrever Penicilina Benzantina IM 1.200.000 em cada glúteo em dose única.
- c. Prescrever Penicilina Benzantina IM 1.200.000 em cada glúteo por duas semanas consecutivas com intervalo de 7 dias entre as doses.
- d. Prescrever Penicilina Benzantina IM 1.200.000 em cada glúteo por 3 semanas consecutivas com intervalo de 7 dias entre as doses.
- e. Tranquilizar a gestante, pois se trata de cicatriz sorológica.

82ª Questão

A Primeira Conferência Nacional de Saúde do Brasil que defendia como um dos seus fundamentos a proteção da maternidade e da infância foi realizada em?

- a. 1953
- b. 2002
- c. 1966
- d. 1988
- e. 1941

83ª Questão

Hematúria sinfaringítica, podendo evoluir para síndrome nefrótica ou glomerulonefrite rapidamente progressiva em menos de 10% dos casos. Hematúria pode ser microscópica com proteinúria leve em 30-40% dos casos.

O texto acima se refere a:

- a. Doença da membrana fina
- b. Glomerulonefrite membranoproliferativa
- c. Doença de Berger
- d. Amiloidose Renal
- e. Síndrome de Alport

84ª Questão

Ainda ao realizar o exame físico de um paciente que apresenta dor abdominal aguda e equimose periumbilical, temos provavelmente um quadro clínico de?

- a. Diverticulite
- b. Colescistite
- c. Apendicite
- d. Pancreatite
- e. Doença inflamatória Pélvica

85ª Questão

O sinal semiológico caracterizado por dor a descompressão da parede abdominal no ponto apendicular (McBurney), é denominado como?

- a. Sinal de Blumberg
- b. Sinal do obturador
- c. Sinal de Murphy
- d. Sinal do Psoas
- e. Sinal de Rovsing

86ª Questão

O aleitamento materno adequadamente realizado é o passaporte para uma busca de saúde plena para a criança. Das assertivas abaixo, qual é contra indicação permanente para o aleitamento materno ?

- a. Mãe com citomegalovirus
- b. Mãe com tuberculose ativa
- c. Mãe com HIV
- d. Mãe na fase crônica de doença de chagas
- e. Infecção materna por hepatite C

87ª Questão

Ao receber o resultado de uma mamografia, a médica de família da equipe da APS, observa na descrição : microcalcificações irregulares, nódulo irregular e neodensidade. O diagnóstico da mamografia é compatível com?

- a. BIRADS 4.
- b. BIRADS 3.
- c. BIRADS 2.
- d. BIRADS 5.
- e. BIRADS 1.

88ª Questão

Qual o exame é fundamental no diagnóstico da colecistite, pois nele é possível determinar espessamento da parede da vesícula, além da presença de cálculos, líquido perivesicular, dilatação de vias biliares?

- a. Ressonância de abdome total
- b. Tomografia de abdome
- c. Colonoscopia
- d. USG de abdome
- e. Endoscopia digestiva alta

89ª Questão

Uma das habilidades esperadas nos médicos que atuam na Atenção Primária , encontra-se na necessidade de fazer o diagnóstico de apendicite aguda. Em relação a esta patologia, analise as assertivas abaixo.

I - É a causa mais frequente de abdome agudo.

II - Apesar de ser mais incidente na segunda e terceira décadas de vida, pode manifestar-se em qualquer idade.

III - Classicamente a dor inicia de modo insidioso no epigastro ou na região periumbilical e posteriormente migra para o quadrante inferior direito.

IV - A anorexia está presente na maioria das vezes. Náuseas e vômitos também podem estar presentes, assim como a hipertermia.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a. Todas as assertivas estão corretas
- b. Apenas I, II e IV estão corretas
- c. Apenas I está correta
- d. Apenas I, II e III estão corretas
- e. Apenas I e II estão corretas

90ª Questão

De acordo com a classificação dos problemas congênito, segundo a patogenia encontradas na prática clínica do médico de família . Podemos classificar o hemangioma como ?

- a. Displasia.
- b. Malformação.
- c. Neoplasia.
- d. Disrupção.
- e. Deformação.

91ª Questão

Ao atender uma gestante assintomática e com exame físico totalmente normal, o médico de família percebe que os exames apresentam um VDRL 1 /8 e FTA ABS positivo. A gestante desconhece passado de sífilis e nunca realizou tratamento para Sífilis. Qual o diagnóstico que podemos atribuir a esta gestante ?

- a. Sífilis secundária.
- b. Sífilis terciária.
- c. Sífilis primária.
- d. Sífilis latente precoce.
- e. Sífilis latente tardia.

92ª Questão

A avaliação dos sinais de alarme são uma ferramenta fundamental para o MFC na busca por uma prática clínica baseada em evidências . Ao atender um lactente de 3 - 4 meses , qual não é um sinal de alerta na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor ?

- a. Assume postura simétrica
- b. Ausência do controle da cabeça
- c. Não fixa olhar sobre objetos
- d. Pobreza de movimentos
- e. Não vira os olhos ou a cabeça para a voz humana

93ª Questão

Os princípios do SUS, da Lei nº 8.080/90, são marcos fundamentais do Sistema Único de Saúde, sendo sua base filosófica e organizacional. Qual das assertivas abaixo não é um princípio desta referida Lei?

- a. Equidade
- b. Universalidade
- c. Integralidade
- d. Participação popular
- e. Longitudinalidade

94ª Questão

Ao atender um paciente com dor abdominal aguda, o médico de família, durante o exame físico, percebe que o paciente reage com dor a palpação do hipocôndrio direito durante a inspiração. Nesse caso o diagnóstico mais provável seria?

- a. Pancreatite
- b. Lítase renal
- c. Colecistite aguda
- d. Apendicite aguda
- e. Bridas

95ª Questão

O manejo e orientações da dermatite de fraldas, é uma competência simples e fundamental que deve ser praticada. Dentre as medidas que devem ser tomadas no manejo da dermatite de fraldas estão as assertivas abaixo exceto:

- a. Trocar com frequência as fraldas.
- b. Manter a pele seca e limpa.
- c. Proteção de barreira.
- d. Secar bem as regiões de faldas.
- e. Usar lenço umedecido com álcool nas trocas de fraldas.

96ª Questão

O Princípio do SUS que preconiza que as pessoas mais vulneráveis e com maior necessidade de saúde devem ter o atendimento priorizado, é o princípio?

- a. Universalidade
- b. Equidade
- c. Participação Popular
- d. Competência cultural
- e. Integralidade

97ª Questão

O vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1 (HTLV) foi descrito pela primeira vez em 1980 como o primeiro retrovírus conhecido como agente etiológico de câncer humano. Sobre esta patologia, assinale as alternativa que contém as afirmações corretas:

- I. A transmissão pode ser vertical, sexual ou sanguínea.
 - II. Infelizmente mais de 50% dos infectados evoluirá com leucemia/linfoma de células T do adulto, pelo menos 20-30 anos após a infecção viral.
 - III. O desenvolvimento de manifestações clínicas dependerá da interação entre o vírus e os fatores genéticos e imunológicos do hospedeiro, sendo que 2 a 5% dos infectados vão evoluir para forma de mielopatia associada ao HTLV-1 / paraparesia espástica tropical.
 - IV. A maioria dos portadores do vírus são sintomáticos.
- a. I, II e III são corretas
 - b. Todas são corretas
 - c. I, III e IV são corretas
 - d. III e IV são corretas
 - e. Apenas II é correta

98ª Questão

O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários costumam seguir uma sequência temporal de fatos. Dentre as opções abaixo, qual geralmente é o mais tardio fenômeno a surgir?

- a. Estirão de crescimento.
- b. Telarca.
- c. Menarca.
- d. Pubarca.
- e. Mudança do padrão corporal.

99ª Questão

São achados clássicos da Insuficiência adrenal, exceto:

- a. Hipoglicemia
- b. Hiponatremia
- c. Alcalose metabólica
- d. Linfocitose
- e. Hipercalemia

100ª Questão

Náuseas, vômitos, diarreia transitória, anorexia e melena podem estar presentes. Comorbidades como arritmias cardíacas e doença aterosclerótica coronariana ou periféricas geralmente estão presentes nos pacientes com diagnóstico de abdome agudo...?

- a. Abdome agudo hemorrágico
- b. Abdome agudo inflamatório
- c. Abdome agudo obstrutivo
- d. Abdome agudo vascular
- e. Abdome agudo perfurativo